

Dapsone, DISULONE®

- **Mode d'action** : antibiotique anti lépreux, action anti-inflammatoire.
- **Contre-indication** : déficit en G6PD (dosage biologique à réaliser avant initiation du traitement)
- **Modalités d'administration** : voie orale, comprimés sécables en 4, en prise quotidienne.
- **Posologie** : 75 à 150 mg par jour
- **Effets secondaires** :
 - Fréquents :
 - Anémie systématique : anémie (baisse de l'hémoglobine) pouvant se traduire par une pâleur, une fatigue, une tachycardie ou un essoufflement à l'effort
 - Élévation de la méthémoglobinémie systématique : lèvres, oreilles bleues, essoufflement à l'effort, tachycardie
 - Photosensibilité : risque accru de coup de soleil
 - Selles noires
 - Vertiges et malaises : surtout en début de traitement
 - Rares :
 - Neuropathie périphérique se traduisant par des fourmillements, et/ou une diminution de la force des bras ou des jambes. Rare et souvent réversible à l'arrêt du traitement.
 - Allergie à type de syndrome d'hypersensibilité : rare, éruption cutanée, fièvre, atteinte du foie (hépatite biologique)
 - Pneumopathies interstitielles diffuses se traduisant par un essoufflement et des anomalies radiologiques.
- **Surveillance** :
 - Biologique : dosage de l'hémoglobine, de la méthémoglobinémie surtout à chaque augmentation de dose.