

Mycophenolate mofetil, CELLCEPT®

- **Mode d'action :** immunosuppresseur, utilisé comme traitement anti-rejet chez les greffés d'organes.
- **Modalités d'administration :** voie orale en prise quotidienne
- **Posologie :** 1 à 3 g par jour
- **Effets secondaires :**
 - Fatigue
 - Troubles digestifs : nausées vomissement
 - Vertiges, malaises
 - Maux de tête
 - Anomalie de la formule sanguine, des plaquettes, du bilan hépatique
 - Infections
 - Sur-risque de cancers de la peau et des ganglions en cas d'utilisation prolongée.
- **Surveillance :**
 - Biologie : prise de sang mensuelle
 - Dosage du médicament dans le sang (AUC) réalisé à l'hôpital parfois utile en cas de signes de toxicité ou d'efficacité insuffisante du traitement.
 - Examen de la peau annuel
- **Vaccinations nécessaires :**
 - habituelles doivent être à jour (DTpolio, ROR)
 - pneumocoque (PREVENAR 13 1 fois et PNEUMOVAX tous les 5 ans)
 - grippe annuelle
 - hépatite B recommandée
 - fièvre jaune si voyage en zone d'endémie prévu
 - varicelle si non immunisé
- **Fertilité grossesse :**
 - Risque de malformation de l'enfant à naître
 - Contraception nécessaire jusqu'à 7 jours après la fin du traitement chez la femme.